

## СТРЕССОРНАЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЯ ПРИ ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Ложкина О.А., Шмидт Е.А., Каретникова В. Н.

ФГБНУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» Россия, г. Кемерово

### Цель исследования:

определение прогностической роли стрессорной гипергликемии при ОДСН у пациентов с различным статусом углеводного обмена.

### Материалы и методы:

200 пациентов с ОДСН:

1 группа с НУО (81); 2 группа без НУО и гипергликемией (70); 3 группа без НУО (49)


Конечная точка повторная госпитализация с ОДСН;

Период наблюдения 365 дней

Нарушения углеводного обмена  
— Пациенты без НУО и нормогликемией (группа 3)  
— Пациенты без НУО с гипергликемией (группа 2)  
— Пациенты с НУО (группа 1)

### Стрессорная гипергликемия:

глюкоза натощак  $> 6,1$  ммоль/л  
при любом измерении  $\geq 7,8$  ммоль/л



**Вывод:** стрессорная гипергликемия у пациентов с ОДСН является важным фактором риска ухудшения прогноза сердечной недостаточности. Пациенты с гипергликемией при ОДСН нуждаются в более тщательном наблюдении и контроле показателей углеводного обмена в течении года после госпитализации.

**Источник финансирования** - фундаментальное научное исследование (Тема № 0419-2022-0002).